



Bulletin de santé du végétal - Auvergne

n°33 du 13/09/2011

Grandes cultures

Colza

Réseau Colza 2011-2012

10 parcelles déclarées dans le réseau Auvergne à ce jour ont fait l'objet de premières observations du 12 au 13 septembre 2011.

Stades des Cultures

La plus grande partie des semis doit être maintenant réalisée sur la région. Sur les parcelles observées les stades atteints se répartissent de semis à 5 feuilles. Les stades B1 et B2 sont cependant dominants.

Les ravageurs demeurent très discrets à ce jour, mais la surveillance régulière des parcelles ne doit pas se relâcher pour autant

Limaces

2 parcelles présentent actuellement des morsures modérées.

Sur les parcelles en cours de levée et sur les très jeunes cultures, nous ne pouvons qu'inciter à faire des observations régulières.

Il n'y a pas de seuil de risque, mais la déprédation peut être rapide en cas de présence sur les plantules jusqu'au stade 3-4 feuilles.

Altises

3 pièges sur 8 présentent des captures de grosses altises dans les pièges enterrés (de 1 à 10 adultes par piège). De plus, 4 parcelles sur 7 révèlent des morsures sur les plantes en ce début de semaine : petites et grosses altises.

Rappel du seuil de nuisibilité : 8 pieds sur 10 portant des morsures, sans que la dépréciation dépasse le ¼ de la surface végétative, pour une période de risque de levée à 3 feuilles.

Betteraves sucrières

Stade des cultures

Les premières récoltes ont commencé. Les échantillons de prélèvements de cette semaine montrent une progression toutefois modeste du poids racine. La richesse moyenne remonte à 17.91 % (17,26 la quinzaine précédente).

.../...

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture d'Auvergne, rédigé par le Cetiom, Arvalis,, le CTBL et les Chambres d'Agriculture de l'Allier, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme en collaboration avec la Chambre d'Agriculture du Cantal, les Ets Cassier, Limagrain, Ets Chassin, Jeudy SA, Sica Bb, Sarl Bastin, les lycées de Marmilhat, Neuvy, Durdat-Larequille et Le Breuil/ Couze, Ets Combronde, Tardif, Tivagrain, Phytosem, Descreaux, Dodat, Coopaca, Thivat Venuat, Fredon, Agrisudest Centre, Altitude, Equation, Coop Eurea, SAS Trescarte, Agri Centre, le Ceta Val de Morge, le Ceta Limagne, Val Limagne.coop et des agriculteurs.



Maladies foliaires

La cercosporiose progresse encore sur toutes les variétés en fréquence de feuilles touchées mais reste relativement basse en intensité.

Les observations sur 21 parcelles donnent des fréquences de 85 à 100 % de feuilles touchées en cercosporiose, exceptée une parcelle à CHARMES à 57 %. L'oïdium est en nette régression où il est observé à 9 % sur une parcelle à RIOM.

Teignes

Les observations sur les 3 pièges donnent les résultats suivants : 1 papillon relevé à CHARMES (03) et 24 % de chenilles, 3 papillons à ENNEZAT (63) et 20 % de chenilles et 1 papillon à BEAUREGARD L'EVEQUE (63) et 1 % de chenilles.

La présence de chenilles au cœur des betteraves est observée dans un grand nombre de parcelles, même dans des parcelles irriguées avec des dégâts importants dans certains cas.

Rhizoctone brun

Dans les parcelles sensibles, toujours présent sans grande extension.

Ce BSV reprend des observations ponctuelles qui donnent des tendances régionales. La Chambre Régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures. Action pilotée par le Ministère chargé de l'Agriculture, avec l'appui financier de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

Directeur de Publication: Jacques Chazalet, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture
Coordonnées référent: François Roudillon (CA 03) - froudillon @allier.chambagri.fr 04-70-48-42-42
Publication Hebdomadaire. Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

